

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Karakteristik responden di RSUD Asri Purwokarta
 - a. Mayoritas karakteristik usia pada responden yaitu usia 20-35 tahun sebanyak 297 orang (88,9%).
 - b. Mayoritas karakteristik paritas pada responden yaitu kelompok nulipara sebanyak 188 orang (56,3%)
 - c. Mayoritas karakteristik pendidikan pada responden adalah SMA sebanyak 145 orang (43,3%)
2. Distribusi frekuensi KPD pada responden sebanyak 209 kasus (62.6%) dari 334 sampel
3. Distribusi frekuensi ibu bersalin dengan ISK yang mengalami KPD di RSUD Asri Purwokarta sebanyak 131 orang (70,1%)
4. Distribusi frekuensi ibu bersalin dengan ISK yang mengalami KPD sebanyak 131 orang (70,1%) dengan hasil nilai $p = 0,002$ (nilai $p \leq 0,05$) dengan derajat kepercayaan 95% yang berarti terdapat hubungan antara ISK dengan kejadian KPD pada ibu bersalin di RSUD Asri Purwokarta.

B. Saran

1. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian lain mengenai faktor risiko terjadinya ketuban pecah dini selain infeksi saluran kemih untuk diketahui penyebab lain terjadinya KPD

2. Saran Bagi Rumah Sakit

Rumah Sakit diharapkan dapat meningkatkan kelengkapan dalam pencatatan rekam medik pasien termasuk hasil laboratorium sehingga memudahkan peneliti selanjutnya untuk penelitian melalui rekam medis

3. Saran Bagi Institusi Pendidikan

Bagi institusi pendidikan diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau materi pembelajaran dan dijadikan untuk memperkaya pengetahuan tentang ISK dengan kejadian KPD

4. Saran Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan ibu hamil lebih rutin pemeriksaan kehamilan secara lengkap sehingga mencegah terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan terutama KPD yang disebabkan oleh ISK