

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan dari ketiga kasus tersebut tidak semua mengalami perubahan tekanan darah intradialisis pada kasus I dan kasus III mengalami perubahan tekanan darah, pada kasus 2 tidak mengalami perubahan tekanan darah. Faktor yang menyebabkan perubahan tekanan darah pada pasien gagal ginjal kronik di pengaruhi oleh usia, stres, dan membatasi intake cairan, dimana jika sampel semakin tua, stress, ansietas, takut, emosi, dan tidak membatasi intake cairan maka bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya perubahan tekanan darah sistole/diastole. Dari keempat jurnal memiliki perbedaan pendapat tentang faktor penyebab perubahan perubahan tekanan darah intradialisis. Diharapkan bagi Rumah sakit terutama Ruang Hemodialisa perlu menetapkan Standar Asuhan Keperawatan Pasien Hemodialisa dan Standart Operasional Prosedur Penanganan semua komplikasi intradialisis (hipertensi, mual muntah, sakit kepala, sesak nafas dll). Perawat harus dapat melakukan asuhan keperawatan pada pasien hemodialisis sesuai standar dan peerawat melakukan monitoring terhadap kondisi pasien yang dilakukan secara kontinyu selama dialisis berlangsung.