

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik responden yaitu usia bayi seluruhnya ada di usia neonatus dini yaitu 120 bayi (90,9%), jenis kelamin di dominasi oleh bayi laki-laki sebanyak 79 bayi (59,8%), berat lahir dengan berat lahir normal sebanyak 117 (88,6%), dan kadar bilirubin total di 9 – 15 mg/dl sebanyak 121 (91,7%).
2. Golongan darah bayi O 61 (46,2%), golongan darah Ibu O 90 (68,2%)
3. Kejadian inkompatibilitas ABO banyak yang mengalami yaitu sebesar 70 bayi (53%)
4. Kejadian *icterus neonatorum* sebanyak 68 (51,5%) yaitu *icterus neonatorum* patologis.
5. Dalam hasil pengolahan data menggunakan uji chi-square dapat diinterpretasikan yaitu terdapat hubungan antara inkompatibilitas ABO dengan kejadian ikterus neonatorum dengan $p=0,026 < \alpha 0,05$.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Instansi Kesehatan Khususnya Rumah Sakit (Tempat Penelitian)

Sebagai bahan masukan dan ilmu pengetahuan untuk membuat intervensi penatalaksanaan icterus akibat ketidaksesuaian golongan darah ibu dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengidentifikasi golongan darah ibu dan bayi sejak lahir meski tanpa indikasi sehingga bisa diantisipasi jika terdapat iketrus akibat ketidaksesuaian golongan darah ABO.

2. Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian yang serupa menggunakan variabel yang lebih banyak, seperti menambahkan variabel jenis persalinan dan pemberian ASI.